中国将加强对菲水果检验检疫

国家质检总局要求各地对辖区进口菲律宾水果检验检疫风险进行评估

新京报讯 （记者廖爱玲 实习生葛南南）国家质检总局昨天发布通知，指出多次从菲律宾进口水果中截获检疫性有害生物，将加强对进口菲律宾水果的检验检疫，加大开箱和抽查比例。同时，要求各局对辖区进口菲律宾水果检验检疫风险进行评估。

国家质检总局昨天通知要求，各地检验检疫机构要对辖区进口菲律宾水果检验检疫风险进行评估，加大开箱和抽查比例。如发现活的有害生物，或者黑斑、腐烂等病害危害状的，要将虫样或样品送实验室鉴定和检测。

国家质检总局表示，检测期间，相关货物不得放行。确认是检疫性有害生物后，按规定对相关货物作检疫、退运或销毁处理。

同时，还要按照《2012年度进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划》，对进口菲律宾水果实施食品安全风险检测，检出不符合国家食品安全标准的水果，一律对货物作退运或销毁处理。对发现的问题，质检总局将向菲方通报，并作进一步风险评估。

2007年6月6日，时任菲律宾总统阿罗约访问成都期间，为菲律宾水果做“代言”。 资料图片

■ 新闻背景

菲进口水果多次检出害虫

据介绍，自去年以来，各地检验检疫机构多次从菲律宾进口水果中截获了检疫性有害生物。

根据通报，上海检验检疫局在进口菲律宾的菠萝和香蕉中多次截获新菠萝灰粉蚧（Dysmicoccus neobevipes Leonardi）。深圳、山东检验检疫局分别从进口菲律宾的香蕉中截获香蕉肾盾蚧（Aonidiella comperei McKenzie）、香蕉枯萎病菌4号小种（Fusarium oxysporumSchlecht.f.sp. cubense （E.F.Sm.） Snyd. et Hans Race 4）。另外，在进口菲律宾水果中截获的有害生物还有蚜科、瓢虫科、蚁科、蝽科、蜘蛛科等害虫。

国家质检总局已多次向菲方通报，要求其调查原因，采取改进措施。

北京非碘盐销售率超国家标准

卫生部表示，我国已消除碘缺乏病危害，北京非碘盐销售占比达10.9%

新京报讯 （记者蒋彦鑫 实习生朱程强）我国碘盐覆盖率达98%，防止碘缺乏病已达到消除标准。但从最新监测结果看，北京、上海非碘盐率上升明显，特别是北京非碘盐销售占比过高，达10.9%，已经超过国家规定的10%以内的标准。

目前我国碘盐覆盖率达98%

我国曾经是碘缺乏病流行较为严重的国家之一，1995年起实施了以食盐加碘为主的综合防治措施，有效地控制了碘缺乏病严重流行的趋势。

昨日，卫生部公布《2011年中国碘缺乏病病情监测报告》。据调查，我国碘盐覆盖率达到98.0%，合格碘盐使用率95.3%，达到碘盐覆盖率大于95%，合格碘盐使用率大于90%的国家标准。对于对碘含量要求较高的儿童和孕妇等群体，目前也达到了标准。

卫生部疾控局国家卫生监察专员肖东楼表示，自1995年以来，我国进行了6次碘缺乏病调查，合格碘盐使用率从当年的39.9%，提升到当前的95.3%，其中8至10岁儿童碘缺乏病已经由原来的20.4%下降为2.5%。97.9%的县、市、区已消除碘缺乏病，这意味着碘缺乏病已经在国家水平上达到消除标准。

但专家强调，碘是人体必需的微量元素，正常人群仍需坚持长期食用碘盐。碘盐使用率的目标在“十二五”时期还需继续巩固。

明年下半年或将再调碘含量

肖东楼表示，卫生部将组织专家，对一些碘含量高或者低的地区，进行定期指导，并加强监测和检查，减少非碘盐的覆盖区域，保证居民都能够买到碘盐。

同时，预计在明年下半年，我国将再次进行全国范围内的碘缺乏病监测，不符合标准的，则在下一步调整碘含量浓度。

■ 焦点

12省份3100万人受高碘威胁

据介绍，此前我国对碘盐的要求是全国统一标准，今年3月起则因地制宜，各省在国家规定的范围内，自行设定碘盐标准。缘何有此要求？肖东楼表示，根据各地水土环境不同，居民当前的含碘水平并不一致。

报告显示，非碘盐率的使用上，北京、上海近年上升幅度较大。从2005年到2011年，北京非碘盐率从7%上升到10.9%，已经高于国家标准的10%。上海则从1.4%上升到7.7%。

同时，江苏、安徽、江西、贵州等地儿童尿碘水平偏高，碘盐浓度有下调空间；天津、上海、福建、广东和广西孕妇尿碘水平偏低，需要进一步关注。

我国水源性高碘地区主要包括北京、天津、河北、陕西、内蒙古、江苏、安徽、福建、山东、河南、陕西和新疆12个省、区、市的130个县，受威胁人口约为3100万人。

■ 释疑

碘过量与甲状腺病无直接关系

一些人认为，吃碘盐过量，会导致甲状腺疾病，这一说法有无道理？

北京协和医院内分泌科教授戴为信表示，目前并没有相关证据可以表明食盐碘过量与甲状腺疾病的肯定性、直接性关系。

戴为信表示，碘过量是由环境问题引起的，与水质和土质有很大关系，而甲状腺疾病病因很多，并不能完全归咎于碘过量。当前，公布的甲状腺疾病患病率的高低主要与居民体检频率有关，甲状腺发病与情绪、体质、饮食等诸多因素有很大关系。

他还指出，必须要纠正一个持续很长时间的错误观点，就是得甲状腺疾病就不可以食用碘盐。“碘是合成甲状腺激素的主要原料，自身不能合成，只能通过外界摄取，无论是否具有甲状腺疾病，都要食用加碘盐。”

新京报记者 蒋彦鑫

■ 北京情况

京部分市民拒食用碘盐

近年，北京无论是城区还是郊区，都能检出非碘盐。此外，由于社会流传北京人碘营养过剩，一些市民拒绝食用碘盐，主动寻找、购买非碘盐。

昨天，记者从北京市卫生局获悉，3月15日起北京已实施新的碘盐标准。对此，北京规定食品加工企业可以使用国家新标准范围中的碘盐，餐饮业应当使用北京市确定的标准碘盐。

北京市卫生局表示，对于今年3月15日以前生产的碘盐，北京规定可以继续销售至保质期结束。

对于北京销售非碘盐占比过高，中国疾控中心地方病控制中心主任孙殿军表示，下一步将督促北京进行调整，让销售碘盐的比重达到90%以上。

新京报记者 温蕊

责编 刘恩峰 图编 杨杰 美编 鲁嘉 责校 王春然